



TESTE SELETIVO – EDITAL N.º 078/2026-PRH BIÓLOGO (ICTIOLOGIA)

NOME DO CANDIDATO: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO: _____

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

- Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado.
- Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado.
- A folha de respostas é o único documento hábil para a correção da prova objetiva e **deverá** ser preenchida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de cor azul ou preta**, conforme o exemplo:



- Na folha de respostas, não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para cada questão; caso isso ocorra, a questão será anulada.
- Não haverá substituição da folha de respostas.
- A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após uma hora e trinta minutos do início da prova.
- O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar isso ao aplicador de prova.
- Este caderno de prova **não** poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas no rascunho abaixo e levá-lo consigo ao término da prova.

Corte na linha pontilhada.

UEM – Edital n.º 078/2026-PRH – Teste Seletivo para a função de Biólogo (Ictiologia)

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respostas																				
Questões	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respostas																				

CRONOGRAMA:

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 04/05/2026, às 17h.
- O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso até a divulgação do resultado final.
- Divulgação do resultado da prova objetiva: 14/05/2026.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 01

Em relação à morfologia do trato digestório e sua relação com a dieta, alguns autores descrevem a importância dos rastros branquiais. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa **correta**.

- A) O número, o tamanho e o espaçamento dos rastros branquiais são indicadores do hábito alimentar, sendo longos e densos em peixes planctófagos.
- B) Os rastros branquiais possuem função exclusivamente respiratória, auxiliando na hematose em águas hipóxicas.
- C) Peixes carnívoros que consomem grandes presas apresentam rastros branquiais muito numerosos, finos e longos.
- D) A ausência total de rastros branquiais é uma característica obrigatória de todos os peixes bentívoros.
- E) Os rastros branquiais substituem funcionalmente o estômago em espécies que possuem digestão exclusivamente intestinal.

Questão 02

Sobre as variações na alimentação dos peixes ao longo do seu desenvolvimento (ontogenia), é possível afirmar que

- A) a dieta de um peixe é determinada geneticamente e permanece rigorosamente a mesma desde a fase larval até a senescência.
- B) larvas de peixes piscívoros alimentam-se exclusivamente de detritos até completarem a formação das nadadeiras pares.
- C) a transição alimentar (ex.: de zooplanctófago para piscívoro) ocorre apenas se houver escassez absoluta do alimento original no ambiente.
- D) mudanças na dieta são frequentes e ocorrem principalmente devido ao aumento do tamanho da boca e à melhoria na capacidade de natação do indivíduo.
- E) ocorre uma diminuição na seletividade alimentar à medida que o peixe cresce, pois o gasto energético de captura deixa de ser relevante.

Questão 03

A metodologia de análise de conteúdo estomacal exige rigor na coleta de dados. Sobre o volume e a repleção estomacal, é **correto** afirmar que

- A) o grau de repleção é uma estimativa visual ou gravimétrica do estado de enchimento do estômago, variando geralmente de vazio a muito cheio.
- B) o peso do conteúdo estomacal é sempre idêntico ao peso da presa viva, independentemente do tempo de digestão decorrido.
- C) estômagos vazios em peixes capturados com redes de espera são sempre indicativos de falta de alimento no ecossistema.
- D) o volume dos itens alimentares deve ser medido obrigatoriamente após a fixação em formol, que expande os tecidos da presa.
- E) o método numérico é o único recomendado para o estudo da alimentação de peixes.

Questão 04

O fator de condição (K) é um índice utilizado em estudos de peixes para

- A) determinar a diversidade de espécies em um trecho de rio.
- B) indicar o grau de higidez de um peixe.
- C) calcular a velocidade da água suportada pela espécie.
- D) identificar o sexo do indivíduo através de morfometria e caracteres secundários.
- E) medir a toxicidade da água para o peixe.

Questão 05

A seletividade alimentar refere-se à relação entre a oferta de alimento no ambiente e o que é efetivamente consumido pelo indivíduo. Sobre esse conceito aplicado aos estudos de peixes, analise as afirmações seguintes e selecione a **correta**.

- A) Um item alimentar é considerado preferencial simplesmente por ser o mais abundante no conteúdo estomacal, sem necessidade de comparação com o ambiente.
- B) A seletividade é um valor fixo da espécie; por exemplo, um peixe selecionará a mesma presa independentemente da densidade de outras presas disponíveis.
- C) Peixes especialistas são aqueles que apresentam um índice de seletividade próximo de zero para todos os itens disponíveis na natureza.
- D) A seletividade resulta da interação entre a acessibilidade da presa (disponibilidade no meio), a capacidade de captura do predador e o valor nutritivo do item.
- E) O índice de abundância relativa no ambiente é suficiente para definir a dieta de uma espécie, tornando a análise de estômagos desnecessária em estudos modernos.

Questão 06

As espécies de peixes podem ser classificadas de acordo com a estratégia reprodutiva. Como se define a estratégia de desova total (ou sincrônica), comum em muitos peixes migradores?

- A) A fêmea libera poucos ovos, mas cuida deles intensamente em ninhos até a eclosão.
- B) A fêmea libera todos os ovos maduros de uma só vez, geralmente em um curto período do ciclo reprodutivo.
- C) O peixe libera ovos em pequenas parcelas ao longo de todo o ano, independentemente da estação.
- D) Os ovos são mantidos dentro do corpo da fêmea até que as larvas estejam prontas para nadar.
- E) A reprodução ocorre apenas em ambiente lântico, sem a necessidade de migração.

Questão 07

A conectividade entre o canal principal de um rio e seus tributários (rios menores que desaguam nele) é vital para a conservação. Qual a alternativa correta em relação ao papel dos tributários livres de barragens em uma bacia hidrográfica alterada por barragens hidrelétricas?

- A) Servir como depósitos de sedimentos para impedir o assoreamento do reservatório principal.
- B) Facilitar a navegação comercial entre diferentes níveis do reservatório.
- C) Garantir que a temperatura da água do reservatório permaneça constante durante o inverno.
- D) Impedir o fluxo de nutrientes para as áreas de jusante da barragem.
- E) Atuar como potenciais rotas alternativas para a reprodução de espécies que não conseguem completar seu ciclo de vida no canal principal barrado.

Questão 08

Sobre a ontogenia das larvas de peixes, a fase de flexão é um marco crítico. O que ocorre morfológicamente com a larva durante esse período específico?

- A) Ocorre a absorção completa do vitelo e o peixe passa a depender exclusivamente de alimento externo.
- B) A larva adquire a forma exata do adulto, mudando apenas de tamanho até a maturidade.
- C) A extremidade distal da notocorda se eleva (flexiona), permitindo o desenvolvimento dos raios da nadadeira caudal.
- D) A larva perde as brânquias externas e passa a utilizar a bexiga natatória para flutuação.
- E) O corpo da larva é dobrado, para melhorar a flutuação no ambiente.

Questão 09

De acordo com o modelo descrito por Winemiller, qual estratégia de ciclo de vida é caracterizada por maturação tardia, alta fecundidade e baixo investimento por prole, sendo comum em grandes migradores?

- A) Oportunista.
- B) Periódica ou sazonal.
- C) R-estrategista Pura.
- D) Sedentária.
- E) Equilíbrio.

Questão 10

O método de abordagem indireta, ou método das séries de desenvolvimento, amplamente utilizado em estudos de ictioplâncton, consiste em

- A) medir a profundidade do rio onde os ovos foram encontrados.
- B) obter ovos e larvas por meio de desovas induzidas.
- C) cruzar espécies diferentes para ver se geram larvas férteis.
- D) identificar as larvas através da vocalização dos adultos próximos.
- E) agrupar indivíduos por semelhança morfológica do maior para o menor (série regressiva).

Questão 11

O conceito de recrutamento é central para gestão pesqueira e conservação. Na ecologia de peixes, como o recrutamento pode ser definido de forma abrangente?

- A) É a sobrevivência e a entrada de novos indivíduos (juvenis) em uma população, garantindo a manutenção do estoque pesqueiro.
- B) É o processo de atrair peixes de outros rios para aumentar a população local através de iscas.
- C) É a morte em massa de larvas devido a mudanças bruscas de temperatura no reservatório.
- D) É o nome dado ao movimento de subida dos rios pelos peixes adultos para a desova.
- E) É a técnica de contagem de escamas para determinar a idade exata de um peixe capturado.

Questão 12

A pesca elétrica é uma técnica amplamente utilizada em riachos de cabeceira. Qual é o princípio biofísico que explica por que peixes maiores são geralmente mais susceptíveis a esse método de captura do que peixes pequenos?

- A) O metabolismo basal elevado de peixes maiores atrai íons negativos, aumentando a eletrotaxia.
- B) Peixes maiores possuem menor resistência elétrica interna devido à maior quantidade de tecido adiposo.
- C) A área de superfície das brânquias em peixes maiores facilita a condução iônica direta da água para o sistema nervoso central.
- D) Peixes pequenos possuem bexiga natatória proporcionalmente maior, o que os isola das correntes de baixa frequência.
- E) A voltagem do corpo aumenta conforme o tamanho do peixe.

Questão 13

Para amostragem de peixes com redes de espera (malhadeiras) são empregados diversos tamanhos de malhas (baterias de redes). Isso é feito com o objetivo de

- A) capturar apenas espécies que são exploradas comercialmente na pesca.
- B) capturar apenas indivíduos grandes das espécies alvo, ou seja, somente as espécies migradoras.
- C) minimizar a seletividade e amostrar diferentes classes de tamanho da comunidade.
- D) facilitar a soltura de peixes vivos após a captura.
- E) atender apenas às determinações dos órgãos ambientais.

Questão 14

Qual das alternativas seguintes apresenta apenas métodos passivos de coleta de peixes?

- A) Puçás e peneiras.
- B) Pesca elétrica e picaré.
- C) Redes de arrasto e espinhéis
- D) Redes de espera e covos.
- E) Redes de arrasto e tarrafas.

Questão 15

Escolha a alternativa que representa, respectivamente, famílias da ordem Characiformes, Siluriformes e Cichliformes.

- A) Characidae, Cichlidae e Loricariidae.
- B) Anostomidae, Acestrorhynchidae e Pimelodidae.
- C) Acestrohynchidae, Characidae e Pimelodidae.
- D) Cyprinidae, Characidae e Loricariidae.
- E) Anostomidae, Loricariidae e Cichlidae

Questão 16

A metodologia **correta** para preparação de lotes de peixes para depósito em coleções científicas é

- A) manter o peixe em gelo e depois congelar.
- B) fixação em formol a 10% e depois congelar.
- C) fixação em formol a 10% e posterior conservação em álcool a 70%.
- D) fixação em álcool a 10% e conservação em formol a 70%.
- E) fixação em formol a 70%.

Questão 17

O conceito de Contínuo de Rio (River Continuum Concept) tem como predição que a estrutura das comunidades de peixes tem alteração em direção da nascente até a foz. Nos trechos de cabeceira (ordens baixas de rio), espera-se encontrar

- A) predomínio de peixes detritívoros de grande porte.
- B) espécies dependentes exclusivamente de produção primária autóctone (algas).
- C) espécies de pequeno porte, muitas vezes dependentes de aportes alóctones (insetos e detritos da mata ciliar).
- D) grandes cardumes de peixes migradores de longa distância.
- E) apenas peixes iliófagos.

Questão 18

Na coleta de ovos e larvas de peixes em ambientes aquáticos (rios), o período e a frequência das coletas são cruciais. Considerando a biologia das espécies migradoras neotropicais, o esforço amostral deve ser intensificado

- A) durante o período de seca (inverno), quando a água está mais fria e mais transparente.
- B) no período de vazante, para capturar juvenis que retornam ao canal principal.
- C) exclusivamente durante o dia, uma vez que as larvas são atraídas pela luz.
- D) apenas quando a temperatura da água estiver abaixo de 18°C.
- E) durante o período de águas altas (verão/piracema), preferencialmente no período noturno.

Questão 19

Para determinar a densidade (indivíduos/m³) nas amostragens de ictioplâncton, obtidas com rede de plâncton cônico-cilíndrica, é necessário qual equipamento que deve estar acoplado à boca da rede?

- A) Fluxômetro, para medir o volume de água que passa pela rede.
- B) Peso de fundeio, para manter a profundidade.
- C) Profundímetro, para medir a profundidade do ambiente.
- D) Copo coletor com malha de 1.000 micras.
- E) GPS, para marcação exata do ponto de deriva.

Questão 20

Peixes da família Curimatidae caracterizam-se por

- A) serem grandes predadores de topo.
- B) possuírem ferrões venenosos nas nadadeiras peitorais.
- C) não terem dentes nas mandíbulas na fase adulta (iliófagos/detritívoros).
- D) viverem exclusivamente em águas subterrâneas (cavernas).
- E) terem corpo cilíndrico e sem nadadeiras pélvicas.

Questão 21

Assinale a alternativa em que a família tem como características o corpo comprimido lateralmente e com nadadeira adiposa presente.

- A) Loricariidae.
- B) Cichlidae.
- C) Gymnotidae.
- D) Characidae.
- E) Synbranchidae.

Questão 22

Levando em consideração a morfologia externa dos peixes, as nadadeiras pares são

- A) dorsal e anal.
- B) caudal e adiposa.
- C) dorsal e peitoral.
- D) anal e pélvica (ou ventral).
- E) peitoral e pélvica (ou ventral).

Questão 23

Em reservatórios profundos, a ocorrência de estratificação térmica pode criar uma camada profunda sem oxigênio denominada hipolímnio. Essa estratificação pode ter impactos sobre a ictiofauna, uma vez que

- A) restringe o habitat disponível para a maioria das espécies, concentrando-as no epilímnio.
- B) atrai peixes migradores para as zonas mais profundas.
- C) facilita a respiração cutânea de bagres e cascudos.
- D) aumenta a taxa de reprodução de peixes bentônicos.
- E) favorece o desenvolvimento da fauna bentônica, usada como alimento pelos peixes.

Questão 24

As lagoas marginais associadas a rios ou às planícies de inundação podem ser consideradas berçários para a ictiofauna neotropical. Qual a principal razão biológica para essa classificação?

- A) A ausência total de predadores nessas áreas.
- B) São rasas, sem heterogeneidade ambiental, favorecendo os peixes jovens.
- C) A baixa temperatura da água que acelera o metabolismo.
- D) A conexão permanente.
- E) A alta disponibilidade de alimento (plâncton e detritos) e abrigos (macrófitas) para larvas e juvenis.

Questão 25

Qual a importância das macrófitas aquáticas para a comunidade de peixes?

- A) Nenhuma, pois elas apenas atrapalham o deslocamento.
- B) Fornecem abrigo contra predadores e substrato para alimentação (perífiton).
- C) Podem levar a diminuição na concentração de oxigênio dissolvido na água de forma permanente, o que é benéfico à ictiofauna.
- D) São a única fonte de alimento para todos os peixes carnívoros.
- E) Impedem a reprodução de peixes invasores de forma seletiva.

Questão 26

Qual a principal ameaça à biodiversidade de peixes em riachos de cabeceira?

- A) Aumento da profundidade natural do canal.
- B) Excesso de peixes migradores de grande porte.
- C) Construção de aquários municipais.
- D) Desmatamento da mata ciliar e assoreamento do leito.
- E) Uso de redes de malha muito larga.

Questão 27

No Brasil, o órgão federal responsável pela política nacional do meio ambiente e diretrizes para fauna é o

- A) IBGE.
- B) IBAMA / Ministério do Meio Ambiente.
- C) Ministério da Pesca e Aquicultura.
- D) Ministérios das Minas e Energia.
- E) ANA.

Questão 28

O conceito do Pulso de Inundação é considerado o principal regulador da vida nas planícies de inundação. Sobre esse processo e sua influência na Zona de Transição Aquático-Terrestre, assinale a alternativa **correta**.

- A) Durante a fase de águas altas (cheia), a decomposição da vegetação terrestre submersa causa um aumento drástico e permanente nos níveis de oxigênio dissolvido em toda a planície.
- B) O pulso de inundação é um fenômeno estritamente hidrológico, não possuindo influência significativa sobre os ciclos reprodutivos de peixes.
- C) A alternância entre as fases de seca e cheia promove a ciclagem de nutrientes e permite que a biota utilize recursos de ambos os ambientes (aquático e terrestre), aumentando a produtividade biológica.
- D) A principal fonte de energia e nutrientes para o sistema rio-planície provém exclusivamente do material transportado pelo canal principal do rio (transporte a montante).
- E) O pulso de inundação atua como um distúrbio negativo que impede o desenvolvimento da biodiversidade, mantendo o sistema em um estado constante de estresse abiótico

Questão 29

Na sistemática filogenética, um grupo monofilético é definido como

- A) um grupo que inclui apenas espécies com hábitos alimentares semelhantes.
- B) um grupo formado por convergência evolutiva.
- C) um grupo que exclui deliberadamente as espécies fósseis.
- D) um grupo que inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes.
- E) um conjunto de espécies que vivem no mesmo bioma.

Questão 30

Peixes detritívoros/iliófagos desempenham um papel fundamental nos ecossistemas aquáticos, pois eles

- A) reciclam nutrientes ao consumir matéria orgânica e microrganismos do sedimento.
- B) controlam a população de grandes predadores.
- C) consomem macrófitas aquáticas em excesso.
- D) são os principais dispersores de sementes de árvores ripárias.
- E) competem diretamente com peixes piscívoros pelo alimento.

Questão 31

Na bacia do alto rio Paraná, as diversas barragens construídas exercem impacto na ictiofauna principalmente por

- A) aumentar a conectividade entre diferentes trechos do rio.
- B) favorecer a reprodução de espécies migradoras de longa distância.
- C) reduzir a incidência de espécies invasoras como a tilápia.
- D) estabilizar o pulso de inundação natural de forma benéfica.
- E) fragmentar o habitat, impedindo o livre trânsito para áreas de desova.

Questão 32

Na sistemática de peixes neotropicais, a família Loricariidae é facilmente reconhecida por

- A) possuir escamas cicloides e dentes caninos bem desenvolvidos
- B) corpo revestido por placas ósseas e boca em posição ventral.
- C) ausência de nadadeira adiposa e corpo coberto por escamas ganoides.
- D) presença de barbilhões longos e esqueleto cartilaginoso.
- E) serem exclusivamente marinhos.

Questão 33

Na análise histológica, a presença de folículos pós-ovulatórios é um marcador crucial. O que a identificação desses folículos, em lâminas de ovários de teleósteos, indica com precisão?

- A) Que ocorreu uma desova recente.
- B) Que a fêmea está prestes a iniciar a vitelogênese primária pela primeira vez.
- C) Que o peixe sofreu um processo de atresia folicular devido a estresse ambiental severo.
- D) Que o indivíduo é um macho que está passando por um processo de inversão sexual (protandria).
- E) A presença de parasitas dentro dos ovários, os quais impedem a maturação final.

Questão 34

A Relação Gonadossomático (RGS) é um indicador amplamente utilizado em estudos de biologia reprodutiva de peixes. Sobre a aplicação e a interpretação do RGS, assinale a alternativa **correta**.

- A) RGS é um valor estático ao longo do ano, servindo apenas para identificar o sexo do animal, independentemente do seu estágio de maturação.
- B) Valores máximos de RGS em uma população indicam, geralmente, o período de repouso reprodutivo.
- C) RGS não sofre influência de fatores ambientais, como temperatura e fotoperíodo, sendo determinado exclusivamente pela idade do indivíduo.
- D) Para o cálculo da RGS, utiliza-se apenas o peso do fígado, uma vez que esse órgão é o principal responsável pela vitelogênese.
- E) O aumento progressivo dos valores de RGS em uma amostragem temporal sugere o desenvolvimento gonadal e a aproximação do período de desova.

Questão 35

A fecundidade é um parâmetro importante para entender o potencial reprodutivo de uma espécie. Considerando os peixes teleósteos com desova total, como a fecundidade é geralmente estimada?

- A) Pela contagem dos ovócitos vitelogênicos que serão efetivamente liberados na próxima desova.
- B) Pela contagem total de todos os ovócitos presentes no ovário, independentemente do diâmetro.
- C) Através do peso total das gônadas dividido pelo peso médio de um único ovócito imaturo.
- D) Pela medição do volume do fluido celomático durante o período de repouso reprodutivo.
- E) Apenas pela Relação Gonadossomático (RGS), sem a necessidade de contagem direta de células.

Questão 36

A análise da estrutura macroscópica das gônadas é fundamental para a identificação dos estádios de maturação. Sobre esse tema, qual característica é determinante para identificar o estágio em Maturação em fêmeas de teleósteos?

- A) Ovários translúcidos e filiformes, ocupando menos de um terço da cavidade abdominal.
- B) Aspecto hemorrágico e flácido, com redução drástica do volume gonadal após a desova.
- C) Ausência total de vascularização periférica e consistência rígida, similar ao tecido conjuntivo.
- D) Presença de ovócitos visíveis a olho nu, de coloração opaca e amarelada, ocupando grande parte da cavidade.
- E) Presença exclusiva de ovócitos hialinos (transparentes) prontos para a extrusão imediata.

Questão 37

A curva de maturação, que relaciona a frequência de indivíduos adultos com o comprimento total, permite determinar o L_{50} . O que representa esse conceito na biologia da reprodução de peixes?

- A) O comprimento máximo que 50% da população consegue atingir antes de morrer.
- B) O volume de água necessário para que 50% dos ovos eclodam com sucesso.
- C) A profundidade de 50 metros onde a maioria das espécies teleósteas realiza a desova.
- D) O comprimento médio em que 50% dos indivíduos da população atingiram a maturidade sexual pela primeira vez.
- E) O índice de gordura visceral que representa 50% do peso total do animal no período de repouso.

Questão 38

A velocidade de digestão (taxa de evacuação gástrica) é um parâmetro crítico para estimar o consumo diário. Dentre as alternativas seguintes, assinale a que apresenta o(s) principal(is) fator(es) que exerce(m) maior influência sobre esse processo.

- A) Apenas a cor da presa e a transparência da água onde o peixe se encontra.
- B) A temperatura da água e a natureza físico-química do alimento (ex.: teor de gordura, presença de carapaças de quitina ou espinhas).
- C) A profundidade em que o peixe foi capturado e a pressão hidrostática exercida sobre a bexiga natatória.
- D) A fase da lua e a alcalinidade da água, sendo a digestão mais rápida em noites mais claras.
- E) Exclusivamente o sexo do indivíduo, visto que fêmeas digerem o alimento mais lentamente durante o período de maturação gonadal.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Questão 39**

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), assinale a medida que **não** é aplicável aos pais ou responsáveis.

- A) Advertência.
- B) Perda da guarda.
- C) Destituição da tutela.
- D) Suspensão da paternidade.
- E) Destituição do poder familiar.

Questão 40

Em relação ao Conselho Tutelar, o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990)?

- A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
- B) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida capacidade moral, idade superior a vinte e quatro anos e residir no município.
- C) Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por novos processos de escolha.
- D) Lei estadual disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros.
- E) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.